Instrucciones

SUTAB



INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre	
Dirección:	
Ciudad:	
Estado:	Código posta <u>l:</u>
Teléfono:	Fax:



1.479 g/0.225 g/0.188 g



Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

DOSIS 1: El día anterior a la colonoscopia

Tome los comprimidos con agua

PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos.

PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda el agua durante un lapso de 15 a 20 minutos.





IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

Beba más agua

PASO 3 Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente 30 minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

DOSIS 2: Día de la colonoscopia

- Siga bebiendo solo líquidos transparentes hasta después de la colonoscopia.
- La mañana de la colonoscopia (5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de cuatro horas después de iniciar la dosis 1), abra el segundo frasco de 12 comprimidos.
- Repita el PASO 1 al PASO 4 de la dosis 1.



IMPORTANTE: Debe terminar de tomar todos los comprimidos de SUTAB y el agua requerida al menos 2 horas antes de la colonoscopia.

El día antes de su procedimiento

Lo que PUEDE hacer

- Puede consu mir un desayuno con pocos residuos. Algunos alimentos con pocos residuos son huevos, pan blanco, queso cottage, yogur, sémola de maíz, café y té.
- · Puede beber líquidos transparentes.

Lo que NO PUEDE hacer

- No beba leche ni consuma nada de color rojo ni morado.
- No beba alcohol.
- No use otros laxantes mientras toma los comprimidos de SUTAB ° (sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio).
- No tome medicamentos por vía oral en el lapso de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes y no menos de 6 horas después de la administración de cada dosis de SUTAB.

Líquidos que PUEDE beber

- Café o té (sin crema ni sustituto no lácteo de crema)
- Jugos de fruta (sin pulpa)
- · Postres de gelatina (sin fruta ni cobertura)
- Agua
- Caldo de pollo
- Bebida gaseosa clara (como ginger ale)

Nota

- SUTAB es un laxante osmótico indicado para la limpieza del colon en preparación para la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. SUTAB puede afectar la eficacia de otros medicamentos.
- Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Las reacciones adversas más comunes tras la administración SUTAB fueron náuseas, distensión abdominal, vómitos y dolor en la parte superior del abdomen.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta vómitos considerables o signos de deshidratación después de tomar SUTAB o si experimenta arritmias cardíacas o convulsiones.
- Si tiene preguntas acerca del uso de SUTAB, llame a su médico.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA	
SU PROCEDIMIENTO	
Hora/fecha:	
Lugar:	
Si tiene preguntas, comuníquese con su prove atención médica al:	edor c

Lea el Prospecto del envase completo y la Guía del medicamento incluidos en el kit.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756.

Se proporciona como un servicio educativo de

de

